

OBCHODNÍ NÁZEV:		Amikacin	
POUŽITÍ:	Léčba infekcí způsobených gramnegativními bakteriemi, jako je E. coli, Klebsiella nebo P. aeruginosa, působí proti leptospirám a některé i vůči stafylokokům.		
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:	<i>ztráta sluchu, závratě, poškození ledvin</i>		
GENERICKÝ NÁZEV:	Amikacin	TŘÍDA:	Aminoglykosidy

OBCHODNÍ NÁZEV:		Apramycin	
POUŽITÍ:	Léčba infekcí způsobených gramnegativními bakteriemi, jako je E. coli, Klebsiella nebo P. aeruginosa, působí proti leptospirám a některé i vůči stafylokokům.		
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:	<i>ztráta sluchu, závratě, poškození ledvin</i>		
GENERICKÝ NÁZEV:	Apramycin	TŘÍDA:	Aminoglykosidy

OBCHODNÍ NÁZEV:		Azidamfenikol	
POUŽITÍ:	Širokospektrá antibiotika účinná proti salmonelovým infekcím a H. influenzae, používá se též k léčbě meningokokových nebo pneumokokových infekcí CNS nebo jako alternativa tetracyklinů u těžkých rickettsiálních infekcí.		
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:	<i>rozvoj aplastické anémie, nevolnost, zvracení</i>		
GENERICKÝ NÁZEV:	Azidamfenikol	TŘÍDA:	Amfenikoly

OBCHODNÍ NÁZEV:		Cefacetril	
POUŽITÍ:	Léčba infekcí vyvolaných grampozitivními bakteriemi, zejména stafylokoky, včetně těžkých infekcí. Enterokoky, meticilin – rezistentní stafylokoky a Staphylococcus epidermidis jsou rezistentní.		
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:	<i>nevolnost, průjem, alergické reakce</i>		
GENERICKÝ NÁZEV:	Cefacetril	TŘÍDA:	Cefalosporiny I. generace

OBCHODNÍ NÁZEV:		Cefadroxil	
POUŽITÍ:	Léčba infekcí vyvolaných grampozitivními bakteriemi, zejména stafylokoky, včetně těžkých infekcí. Enterokoky, meticilin – rezistentní stafylokoky a Staphylococcus epidermidis jsou rezistentní.		
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:	<i>nevolnost, průjem, alergické reakce</i>		
GENERICKÝ NÁZEV:	Cefadroxil	TŘÍDA:	Cefalosporiny I. generace

OBCHODNÍ NÁZEV:		Cefaklor	
POUŽITÍ:	Léčba infekcí vyvolaných stafylokoky nebo způsobených gramnegativními bakteriemi rezistentními na méně účinná antibiotika. Hemofilové infekce (ampicilin rezistentních), kapavka, chirurgická profylaxe aj.		
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:	<i>nevolnost, průjem, alergické reakce</i>		
GENERICKÝ NÁZEV:	Cefaklor	TŘÍDA:	Cefalosporiny II. generace

OBCHODNÍ NÁZEV:		Cefalexin	
POUŽITÍ:	Léčba infekcí vyvolaných grampozitivními bakteriemi, zejména stafylokoky, včetně těžkých infekcí. Enterokoky, meticilin – rezistentní stafylokoky a Staphylococcus epidermidis jsou rezistentní.		
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:	<i>nevolnost, průjem, alergické reakce</i>		
GENERICKÝ NÁZEV:	Cefalexin	TŘÍDA:	Cefalosporiny I. generace

OBCHODNÍ NÁZEV:		Cefalonium	
POUŽITÍ:	Jsou to širokospektrá antibiotika s indikačním omezením, určená k léčbě závažných smíšených infekcí u nemocných s jiným těžkým onemocněním (imunoprese, neutropenie).		
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:	<i>nevolnost, průjem, alergické reakce, krvácivost</i>		
GENERICKÝ NÁZEV:	Cefalonium	TŘÍDA:	Cefalosporiny IV. generace

OBCHODNÍ NÁZEV:		Cefalotin	
POUŽITÍ:	Léčba infekcí vyvolaných grampozitivními bakteriemi, zejména stafylokoky, včetně těžkých infekcí. Enterokoky, meticilin – rezistentní stafylokoky a Staphylococcus epidermidis jsou rezistentní.		
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:	<i>nevolnost, průjem, alergické reakce</i>		
GENERICKÝ NÁZEV:	Cefalotin	TŘÍDA:	Cefalosporiny I. generace

OBCHODNÍ NÁZEV:		Cefamandol	
POUŽITÍ:	Léčba infekcí vyvolaných stafylokoky nebo způsobených gramnegativními bakteriemi rezistentními na méně účinná antibiotika. Hemofilové infekce (ampicilin rezistentních), kapavka, chirurgická profylaxe aj.		
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:	<i>nevolnost, průjem, alergické reakce</i>		
GENERICKÝ NÁZEV:	Cefamandol	TŘÍDA:	Cefalosporiny II. generace